




## Cítricos Control Cotonet de Sudáfrica

A diferencia de otras especies de pseudocóccidos, el cotonet de Sudáfrica está activo en los meses de invierno. Se localiza preferentemente en la copa, pero una parte de la población, no más de un 20-30%, transitan por el tronco o están en el suelo junto al tronco, hasta unos 30-40 cm del tronco. Este movimiento empieza a ser visible a finales del invierno. En las parcelas con mayor población de cotonet de Sudáfrica, es más fácil observar este movimiento de hembras con o sin ovisaco desplazándose por el tronco.

En aquellas parcelas en las que fácilmente se observe hembras de cotonet desplazándose por el árbol sería adecuado realizar un tratamiento previo a la floración con el objetivo de reducir la población antes de que el fruto comience su desarrollo. Los tratamientos deberán dirigirse al interior del árbol alcanzando el tronco, las ramas principales y la copa.

En el control del cotonet de Sudáfrica se asocian varias especies de depredadores generalistas, de manera que conservar y favorecer su presencia es clave para un control eficaz de esta especie de cotonet y de otras especies plaga. Este es el motivo por el que las **materias activas recomendadas** para este tratamiento en prefloración son: **aceite de parafina, aceite de naranja**.



Hembras de cotonet de Sudáfrica en tronco



Hembras de cotonet de Sudáfrica en rama principal



Hembras de cotonet de Sudáfrica en el suelo al lado del tronco

Al elegir un formulado de cualquiera de estas materias activas se prestará especial atención a los usos y dosis autorizadas, así como a las condiciones de uso y manipulación.

<https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/registro/menu.asp>

También se considerarán los efectos secundarios de los productos a utilizar:

<http://gipcitricos.ivia.es/wp-content/uploads/2012/09/Efectos-seundarios-22-2-13.pdf>

