



## Viña

### Aviso de tratamiento para la Zona Centro de Valencia, Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó y la Vall d'Albaida

#### Polilla del racimo (*Lobesia botrana*): 2ª Generació

El seguimiento del ciclo biológico de la polilla del racimo se está llevando a cabo, como en años anteriores, desde el Servicio de Sanidad Vegetal, en colaboración con los técnicos de viña de Cooperatives Agroalimentaries CV de Valencia y Alicante.

En la zona Centro de la provincia de Valencia (desde el Marquesado de Llobai hasta Villar del Arzobispo), así como en la zona de la Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó y la Vall d'Albaida, comenzaron a observarse adultos de la 2ª generación los últimos días del mes de mayo, llegando al máximo de capturas a final de la primera decena de junio.

Durante la prospección de puestas realizada a mitad de junio ya se observó la presencia de puestas sobre racimos, predominando los huevos de color amarillo.

El nivel de plaga se encuentra alrededor de un 35% de racimos atacados, por lo que desde el Servicio de Sanidad Vegetal se recomienda realizar un tratamiento insecticida contra esta plaga.

Las **fechas idóneas** para la realización de dicho **tratamiento** son **entre el 17 y el 21 de junio, ambos inclusive**.

El vuelo de adultos de esta segunda generación está siendo muy corto, por lo que con un único tratamiento será suficiente para un buen control de la plaga.

Aquellas parcelas en las que se está practicando la confusión sexual, no es necesaria la realización de este tratamiento insecticida, ya que el grado de ataque observado en estas parcelas está muy por debajo del umbral de tratamiento.



Huevo blanco sobre racimo



Huevo amarillo sobre baya

### **Mildiu (*Plasmopara viticola*)**

Las condiciones meteorológicas para el ataque de este hongo han sido muy favorables en las últimas semanas. En líneas generales, se observa un buen control de la enfermedad, pero se observan algunas manchas aisladas que podrían desarrollar nuevas contaminaciones.

Por este motivo, recomendamos seguir con la protección del viñedo frente a este hongo, utilizando fungicidas del grupo de los penetrantes y/o sus mezclas.



Mancha de aceite sobre hoja: contaminación primaria

### **Oídio (*Uncinula necator*)**

Nos encontramos en un período de alto riesgo para el ataque de este hongo. Por ello, se recomienda seguir manteniendo la protección de la viña.



Oídio sobre hojas



Primeros síntomas de oídio en racimo

**NOTA:** Para una información más detallada sobre las materias activas a utilizar en el control de los parásitos mencionados, les recomendamos ponerse en contacto con los técnicos de las zonas, o con el Servicio de Sanidad Vegetal.

También pueden realizar la consulta directamente en el siguiente enlace:

<https://servicio.mapa.gob.es/regfiweb>

Silla (Valencia), 16 de junio de 2023

